

التربة ومكوناتها

التربة ثروة طبيعية مهمة تغطي الكثير من سطح الأرض. تعتمد الحياة في الأرض على التربة بوصفها مصدراً مباشراً، أو غير مباشر للطعام. فالنباتات مثلاً متغذرة في التربة، وتحصل منها على المغذيات (المواد المغذية)، والحيوانات تحصل كذلك على المواد المغذية من النباتات، أو من الحيوانات التي تأكل النباتات. تسبب ميكروبات معينة في التربة تحلل العضويات الميتة التي تساعده على إعادة المواد المغذية للتربة. وبإضافة لذلك فإن العديد من الحيوانات يجد الحماية في التربة.

تحوي التربة المعادن والمواد العضوية والنباتية والحيوانية الأخرى وكذلك الهواء والماء. وتتغير محتويات التربة بانتظام. هناك العديد من أنواع التربة، ولكن منها خواص مميزة بما في ذلك اللون والتركيب. ويساعد نوع التربة في منطقة ما في تحديد القدرة على نمو المحاصيل بها. وتشكل التربة ببطء وتدمّر بسهولة ولذلك يجب أن ت-chan حتى يمكن لها أن تستمر في دعم الحياة.

يستخدم علماء التربة مصطلح البوليبيدونات لكتل المختلفة من التربة في منطقة جغرافية معينة. ويمكن أن تكون هذه الكتل كبيرة الحجم، وبلا حدود، ولكن بعضها له مساحة سطحية قدرها متر مربع واحد فقط، ولبعض البوليبيدونات سمك يقل عن 13 سم. ومقطع التربة مصطلح يستعمل للتعبير عن تركيب التربة.

تركيب التربة

تسمى المعادن والجسيمات العضوية في التربة جسيمات التربة. ويشغل الهواء والماء الفراغ بين الجسيمات، وتعيش النباتات والحيوانات في هذه الفراغات المسامية وتنمو جذور النباتات أيضاً خلال الفراغات المسامية.

المعادن: تمد المعادن النباتات الخضراء بالماء المغذية. وتشكل الجسيمات المعروفة باسم الرمل والغرين والطين معظم المحتوى المعدني للتربة.

والرمل والغرين جسيمات لمعادن الكوارتز والفلسبارات. تتكون الأطيان من الإليت والكاولين والمايكات والفيرمكولييت، ومعادن أخرى. وتضيف كميات شديدة من معادن عديدة المواد المغذية للتربة ومنها الكالسيوم والفوسفور والبوتاسيوم. ومعظم الترب تسمى ترباً معدنية لأن أكثر من 80% من جسيماتها معادن.

النباتات والمواد الحيوانية: تتكون من مواد عضوية في مراحل متفاوتة من التحلل. ويعيش العديد من العضويات أيضاً في التربة. تحوي عضويات التربة جذور النباتات والميكروبات وبعض الحيوانات كالديدان والحرشات والثدييات الصغيرة. وتفتكك البكتيريا والفطر والميكروبات الأخرى النباتات والحيوانات الميتة. ويساعد العديد من عضويات التربة والجسيمات العضوية والمعادن على التجمع (التقاب) وتكون كتل من التربة. وتكسر الجذور والحيوانات الحافرة والتتجوية الطبيعية كل التربة الكبيرة.

تطلق المواد العضوية المتحللة المواد المغذية في التربة. وبإضافة إلى ذلك تتحد بعض المواد العضوية مع الجسيمات المعدنية. وتشكل المواد المتحللة الأخرى جسيمات تربة عضوية تسمى الدبال. ومعظم الدبال يكون أسود أو ذا لونبني غامق، ويحمل كمية كبيرة من الماء. ويشكل الجزء العضوي من 6% إلى 12% فقط من حجم الجسيمات في معظم أنواع التربة المعدنية. وبالرغم من ذلك فإن هذه الكمية الضئيلة تزيد كثيراً من مقدرة التربة لدعم حياة النبات. وفي بعض الترب التي تسمى التربة العضوية تمثل العضويات أكثر من 20% من جسيمات التربة.

الماء: يدخل الماء إلى التربة فيذيب المعادن والعناصر الغذائية، ويشكل محلول التربة. ويتسرب الكثير من المحلول بعيداً ولكن يبقى بعضه في الفراغات المسامية. تحصل النباتات الخضراء على الماء وبعض المواد المغذية بامتصاص محلول التربة من خلال جذورها.

الهواء: يحل الهواء مكان الماء الذي يتسرّب عبر الفراغات المسامية الكبيرة. وتعيش عضويات التربة بطريقة أفضل في التربة التي تحتوي دائماً على كميات متساوية تقريباً من الماء والهواء.

كيف تتكون التربة

التربة تبدأ بالتكوين حين تكسر الأمطار والثلج والعوامل البيئية الأخرى، الصخور والمواد المشابهة. تكسر المادة الناتجة التي تسمى المادة الأم إلى جسيمات معدنية.

العضويات البسيطة تعيش على الصخور التي تتحلل (تفتكك). ينتج نبات الأشنة أحماضًا تساعد على تحلل الصخور. وحينما تموت الع陬يات تجتمع المواد الع陬ية بين الجسيمات المعدنية.

الطبقات المسماة نطاقات. تحوي الطبقة العليا أو النطاق أ و مواد ع陬ية أكثر وتصبح عميقه بدرجة كافية لدعم بذور النبات. أما الطبقة السفلية أو النطاق ج فتشبه المادة الأم.

الترفة المتطرفة تستطيع تدعيم غطاء صحي من المزروعات. وقد تحوي أيضًا طبقة وسطى تسمى النطاق ب. هذا النطاق يحوي معادن غسلت بماء الصرف من سطح الترفة.

تبدأ الترفة في التشكل حين تحلل القوى البيئية الصخور، والمواد المماثلة والتي تقع على سطح الأرض أو قريباً منه. ويسمى علماء الترفة المواد الناتجة المادة الأم. ومع تطور الترفة على مر القرون تجتمع المواد الع陬ية، ويصبح تشابه الترفة لمادتها الأم أقل فأقل. وربما تزير المثالج والأنهار وقوى بيئية أخرى المادة الأم والترفة من منطقة لأخرى.

يختلف تشكيل الترفة حسب تأثير العوامل البيئية المختلفة. وتشمل هذه العوامل:


- 1 - أنوع المادة الأم.
- 2 - المناخ.
- 3 - معلمات سطح الأرض.
- 4 - النباتات والحيوانات.
- 5 - الزمن.

1 - أنواع المادة الأم: تساعد المادة الأم في تحديد نوع الجسيمات المعدنية في الترفة. وتكسر عملية تسمى التجوية المواد الأم إلى جسيمات معدنية. وهناك نوعان من التجوية:

- A - التفتت الطبيعي
- B - التفتت الكيميائي.

A - التفتت الطبيعي: يتسبب فيه الجليد والمطر، وقوى أخرى. تفتت هذه العمليات الصخر إلى جسيمات صغيرة لها نفس تركيب المادة الأم، وينتج الرمل والغررين من التفتت الطبيعي.

B - التفتت الكيميائي: يؤثر بشكل أساسي في الصخور سهلة التجوية. وفي هذا النوع من التجوية تتكسر البنية الكيميائية للصخر، بينما يذيب الماء معادن معينة في الصخر.
ينتج التحلل الكيميائي عناصر تختلف في تركيبها الكيميائي عن المادة الأم، وتذوب بعض هذه المواد في محلول الترفة، وتصبح جاهزة في شكل مواد مغذية للنبات. وتتحلل مواد أخرى وتكون جسيمات طينية أو معادن جديدة.
يؤثر المحتوى المعدني للمادة الأم أيضاً على نوع النباتات التي تنمو في ترفة ما. فعلى سبيل المثال تنمو النباتات، بما في ذلك الصحراوية والوادية، بشكل أفضل في الترفة الحمضية التي تحوي كمية كبيرة من الحديد.



الترفة المنتظورة
تستطيع تدعيم غطاء صحي في المزروعات، وقد تحوي أيضًا طبقة وسطى تسمى النطاق ب. هذا النطاق يحوي معادن غسلت بماء الصرف من سطح الترفة.

الطبقات المسماة
تطقات، تحوي الطبقة العليا أو النطاق أ مواد ع陬ية أكثر وتصبح عميقه بدرجة كافية لدعم بذور النبات. أما الطبقة السفلية أو النطاق ج فتشبه المادة الأم.

العضويات البسيطة
تحيش على الصخور التي تتحلل (تفتكك)، ينبع نبات الأشنة الأخرى، الصخور والمواد المشابهة، تحلل الصخور، وحينما تتكسر المادة الناتجة التي تسمى العادة الأم إلى جسيمات ع陬ية المادة الأم.

الترفة تبدأ بال تكون حين تكسر الأمطار والثلج والعوامل البيئية التي تتحلل (تفتكك)، أحماضًا تساعد على تحلل الصخور، و حينما تتكسر المادة الناتجة التي تسمى العادة الأم إلى جسيمات ع陬ية المادة الأم.

يعتمد تكون الترفة على التأثير الجماعي لعدة عوامل هي 1- الصخر الذي تكونت منه الترفة، 2- المناخ، 3- الع陬يات، 4- الوقت. ت تكون الترفة ببطء وفي عملية مستمرة، تبين الأشكال أعلاه كيف تكون الترفة العادية ثم تتطور عبر القرون.

تعرض الترفة للتكون والتدمر باستمرار. وربما تدمر عمليات التعرية التي تتسبب فيها الريح والمياه التربة التي استغرق تكوينها آلاف السنين بسرعة.

2 - المناخ: يؤثر المناخ في النشاطات الحيوية والكيميائية في التربة بما في ذلك أنواع ومعدلات التجوية. فالنفحة الطبيعية على سبيل المثال هو النمط السائد من التجوية في المناخ الجاف البارد. تشعج درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة على التحلل والنفحة الكيميائية. وبالإضافة إلى ذلك فإن معظم نشاطات التربة الأخرى تتطلب ظروفاً دافئة ورطبة. وتهدأ هذه النشاطات أو حتى تتوقف في الطقس البارد. ولذلك فإن التربة في المناخ الجاف تجنب لأن تكون أكثر ضحالة وأقل تطوراً عن تلك الموجودة في أقاليم دافئة ورطبة.

3 - معلم سطح الأرض: تتحكم تلك المعالم أيضاً في كمية التربة المتكونة في منطقة ما. فمثلاً تعرى المياه الجارية على الأرض التربة وتعرض صخوراً جديدة للتجوية. ونلاحظ أن تربة المنحدرات تصاب بالتجوية أسرع من تلك التي على مناطق منبسطة وأن فرسحتها في التكون قليلة. ولذلك فإنها ليست متطرفة كتلك التربة الواقعه على أراضٍ منبسطة.

4 - النباتات والحيوانات : تساعد عضويات التربة والمواد العضوية التربة على التطور وتحميها أيضاً من التجوية. كما يضييف موت وتحلل النباتات والحيوانات مواد عضوية للتربة. وتساعد هذه المواد العضوية التربة على دعم عضويات جديدة. ولا تتآكل التربة ذات الغطاء النباتي، والتي تحتوي على كمية كبيرة من المواد العضوية بسهولة.

5 - الزمن: تكون التربة المعرضة لعمليات التربة بكثافة ولمدة طويلة، عميقه وجيدة التطور، بينما تكون التربة سريعة التآكل - أو التي حُرمت من مثل هذه العمليات فترة طويلة من الزمن - أقل تطوراً.

خواص التربة

تختلف طريقة ومعدل تشكيل التربة في أجزائها المختلفة. ونتيجة لذلك فإن التربة تكون طبقات تسمى نطاق التربة. وقد تكون نطاق التربة سميكة أو رقيقة، وقد تتشابه أو تختلف النطاق المحيطة. ويمكن أن تميز الحدود بين الطبقات ولكنها أحياناً تكون صعبة الملاحظة.

تحوي معظم الترب ثلاثة نطاق رئيسي. منها النطاقان أ و ب، وهما جيداً التكوين. ويعرف النطاق أ أيضاً باسم قمة التربة أو التربة الفوقية. أما النطاق الثالث فهو النطاق السفلي المسمى ج أو التربة التحتية. وهو معرض للقليل من عمليات التجوية. ويمثل تركيبه تركيب المادة الأم. ويصف علماء التربة، الترب من خلال خواص نطاق التربة. ويشمل هذا:

- 1 - اللون
- 2 - النسيج
- 3 - البنية
- 4 - التركيب الكيميائي.

1 - اللون: تترواح التربة في ألوانها بين الأصفر والأحمر والبني الغامق والأسود. ويساعد لون التربة علماء التربة في تقدير كمية الهواء والماء والمواد العضوية وبعض العناصر في التربة. فقد يدل اللون الأحمر مثلاً على وجود مرکبات الحديد في التربة.

2 - النسيج: يعتمد على حجم جسيمات التربة المعدنية. وأكبر الجسيمات هي جسيمات الرمال. ويمكن للمرء أن يرى ويحس حبيبات الرمل المفردة. وجسيمات الغرين كبيرة لحد يجعلها ترى بشكل كاف، أما جسيمات الطين فهي ذات حجم مجهرى. ويقسم علماء التربة الترب إلى فئات نسيجية على أساس كميات الرمل والغررين والطين الموجودة في التربة. فالأجزاء المعدنية للترابة والتي تصنف تحت اسم الطفل الرملي تحتوي على 27% طيناً وأقل من 52% رملًا. وفي الطين الغريني تكون أكثر من 40% من الجسيمات المعدنية من الطين وأكثر من 40% من الغرين. ويساعد النسيج في تحديد كيفية صرف الماء من التربة. فالرمل يسمح بالصرف أكثر من الطين.

3 - البنية: حينما تجتمع جسيمات التربة، تشكل كتلاؤ من التربة تسمى طفلاً. ومعظم الطفلات تتراوح أقطارها بين أقل من 1,5 و15 سم. ويحدد شكلها وترتيبها بنية التربة. وقابلية الطفلات وجسيمات التربة للتلاصق بعضها مع بعض وتحديد شكلها يسمى المثانة.

وتحوي معظم الترب نوعين أو أكثر من البنيات إلا أن بعض الترب ليس لها بنيات محددة. وفي بعض هذه الترب لا يكون للطفلات شكل أو ترتيب محدد، أما في ترب أخرى فإن الجسيمات لا تجتمع أصلاً.

وهناك ثلاثة أنواع رئيسية من بنيات التربة:

أ - طبقية الشكل

ب - منشورية الشكل

ج - كتالية الشكل.

والطفلات طبقية الشكل رقيقة وذات أطباق أفقية موجودة في أي نطاق. والطفلات منشورية الشكل هي بنيات تربة تحتية عمودية الشكل. أما الطفلات كتالية الشكل فتبعد كالكتل وهي ذات جوانب منبسطة أو منحنية. وتوجد الطفلات كتالية الشكل الكبيرة، ذات الجوانب المسطحة، عادة في التربة التحتية. أما الطفلات كتالية الشكل الصغيرة المتكونة ف تكون معظم التربة الفوقية. وهي تحوي مواد عضوية أكثر وماء ومواد مغذية أفضل من الطفلات الكبيرة.

4 - التركيب الكيميائي: يمكن أن تكون التربة حمضية، أو قلوية، أو متعادلة. وتؤثر كمية الحمض والقلوي في التربة على العمليات الحيوية والكيميائية التي تجري فيها. وقد تؤدي الترب ذات الحمضية أو القلوية العالية العديد من النباتات. وتدعم الترب المتعادلة معظم العمليات الحيوية الكيميائية، بما في ذلك العمليات التي من خلالها تحصل النباتات على العديد من المواد المغذية. وتسمى هذه العمليات التبادل الكاتيوني. يذوب العديد من المواد المغذية والعناصر الأخرى في محلول التربة مكونة جسيمات موجبة الشحنة تسمى كاتيونات. ويذوب الطين والدبال الكاتيونات سالبة الشحنة، ويعندها من أن تُصفى (تُغسل بعيداً) من التربة الفوقيّة بوساطة مياه الصرف. ويحوي محلول الذي يتبقى في التربة كاتيونات أخرى. (الكاتيونات الغذائية التي في الطين والدبال). وتتبادل الكاتيونات الغذائية في الطين والدبال وذلك التي في محلول التربة الأماكن مع الكاتيونات غير الغذائية التي في الجذور. وبهذا تستطيع الجذور امتصاص الغذاء.

كيف تصنف التربة

لا يوجد إجماع دولي على تصنيف التربة. فقد وضعت معظم البلدان نظم التصنيف الخاصة بها تبعاً لاختلافات في تربتها. ووضعت منظمة الأغذية والزراعة، التابعة للأمم المتحدة (الفاو) نظاماً تصنيفياً. وتستخدم نظام الفاو، بصفة عامة، الدول النامية التي لم تطور بعد نظام تصنيفها.

وكانت المحاولة الأولى لتصنيف التربة في روسيا في ثمانينيات القرن التاسع عشر. وقد اعتمد هذا التقسيم على الاعتقاد بأن نوع التربة يحدده، بشكل كبير، المناخ.

يعرف هذا النوع من التصنيف بالتصنيف النموذجي، وقد تطور خلال الخمسين عاماً الأولى من القرن العشرين. ولكن بعض العلماء اليوم يعتقدون أن عوامل أخرى كثيرة تكون مسؤولة عن تكوين التربة واختلافاتها. وأدى هذا إلى أن يستبدل بالتصنيف النموذجي تصنيفات تعريفية تبني على وصف التربة. وفي التصنيف التعريفي تجمع الترب المتشابهة لحد كبير معًا بدون وصف طريقة تشكيلها.

صيانة التربة

تسهم ترب الأرض الزراعية، وترب أراضي المراعي والغابات في توفير العديد من المنتجات وفي توفير مناطق الترويج، ولذلك ينبغي صيانتها. ويعمل حماة التربة على التأكد من الاستعمال الرشيد للتربة.

يستلزم الاستعمال الرشيد للأراضي الزراعية الحفاظ على مستوى عالٍ من العناصر الغذائية والمواد العضوية في التربة المزروعة. ويضيف المزارعون مواد عضوية للترابة بحرث الأرض تحت بعض النباتات الخضراء. ويضيفون أيضًا مخصبات (سمادًا) ويدبرون المحاصيل ليعواضوا العناصر الغذائية التي أزالتها النباتات النامية. وبالإضافة إلى ذلك فإن المزارعين يحرثون حقولهم ويزرعونها بطرق تمنع التعريفة.

تعاني أراضي المراعي التي استخدمت بصورة جائزة أيضًا التعريفة، حيث يقلل الإفراط في الرعي كمية النباتات، والمواد العضوية في التربة. وتصاب التربة بالتعريفة بسهولة في حال وجود جذور نباتية قليلة لتثبيتها في مكانها. ويصون الفلاحون أراضي المراعي بتحديد الفترة الزمنية التي ترعى فيها الماشي في منطقة واحدة.

يجب أن تُصان أراضي الغابات أيضًا من التعريفة. وفي بعض الحالات يترك قاطعو الأشجار أفرعاً غير مستعملة وأجزاء أخرى من الأشجار على أرض الغابة لتضيف مواد عضوية للترابة. كما أنهم يعملون على تطوير مجموعات من الأشجار الكبيرة والصحية التي تعمل جذورها على صيانة التربة بتثبيتها في أماكنها ضد التعريفة التي تسببها الريح والماء.