



أنواع الأسنان ووظائفها



الأسنان عند الحيوان

يتاسب شكل أسنان الحيوان مع نوع الغذاء الذي يتناوله. فالحيوانات اللاحمة تمتاز بأنياب حادة تمكّنها من تمزيق اللحم، وبأضراس تساعدها على طحن اللحوم وسحق العظام. والحيوانات العاشبة تتميز بنوعين من الأسنان: القواطع لقطع الأعشاب والأضراس لطحنها وليس لها أنياب. أما الحيوانات الكالثة فالتركيبة الكاملة لأسنانها تساعدها على أن تتغذى في آن واحد على النبات وعلى الحيوان فهي تتميز: بأنياب لتمزيق اللحم وبقواطع لقطيعها وبأضراس لطحن الغذاء.

وبمجرد التثبت في أسنان أي جمجمة حيوان يمكننا معرفة ما إذا كان هذا الحيوان لاحم أو عاشب أو كالث.



النمر : يتسلل النمر خلسةً نحو طريته قبل أن ينقض عليها في اللحظة الأخيرة ويقوم بغرز أنيابه في رقبة الضحية ويطبق أسنانه


الصغيرة على القصبة الهوائية فتنفع الأكسجين من الدخول للدماغ وتموت الضحية مختفقة. وتصميم أسنانه مناسب جداً لأداء هذه المهمة، فهناك نابان بارزان في الفك العلوي ونابان بارزان في الفك السفلي وبقية الأسنان صغيرة.



الضبع : هو حيوان مفترس من الحيوانات التي تعيش على أكل الجيف وبقايا صيد وفرائس الحيوانات الأخرى، وهو صياد ماهر كذلك، ويتميز بقوة فكيه الهائلة، فهو يمكنه من سحق العظام بأنيابه وأضراسه القوية والكبيرة والحادية.




البقرة : لا يوجد لغالبية الحيوانات المجترة بالفك العلوي أسنان أمامية (قواطع وأناب)، وإنما توجد مكانها منطقة لحمية صلبة، تقوم الأسنان الأمامية للفك السفلي ، بقضم وتمزيق الحشائش وأوراق الأشجار. أما الأسنان الخلفية (الضروس الأمامية والخلفية) ، فلها سطوح منبسطة ذات حواف صلبة ، وتقوم بطحن الغذاء أثناء مضغ الحيوان له.




الخنزير: الخنزير حيوان مفترس شرس الطبع، يأكل الجرذان والفئران وغيرها، ويتغذى من القamaة والفضلات بشرابة ونهم، كما أنه يأكل الجيف حتى من أقرانه. ويقوم بالحفر بالعظامين الكائنين في مقدمة فكه في التراب الرطب باحثاً عن الديدان وعن ثمار الفستق السوداني والبطاطا وغيرها، وكل حيوان كالش فهو يمتلك لقواطع وطواحن وأنيات.

الأسنان عند الإنسان



تنمو عند الإنسان مجموعتان من الأسنان: أسنان مؤقتة وأسنان دائمة. تظهر الأسنان المؤقتة بشكل فردي وتتسقط تدريجياً في الفترة المبكرة من الحياة. وتستبدل بالأسنان واحدة تلو الأخرى الأسنان الدائمة. تتوافر للأسنان المؤقتة والدائمة نفس البنية الأساسية. يتتألف كل سن من تاج وجذر واحد أو أكثر. والتاج هو ذلك الجزء من السن الذي يمكن مشاهدته في الفم. أما الجذر فهو ذلك الجزء الغاطس في اللثة. تثبت الجذور السن في مغز داخل عظم الفك.


الأسنان المؤقتة



تسمى أيضاً أسنان الأطفال أو الأسنان اللبنية أو الأسنان الأولية. يبدأ تشكيلها قبل سبعة أشهر ونصف من الولادة. تبدأ الأسنان المؤقتة على شكل انتفاخات بيضية أو دائيرية تسمى البراعم وتطور تدريجياً لتصبح أسناناً. وتوجد أجزاء من الأسنان المؤقتة في عمق الفكين عند ولادة الطفل. ومع النمو، تتدفع الأسنان خارج اللثة وتدعى هذه العملية بروز الأسنان أو التنسين. تبدأ الأسنان بالظهور عند الأطفال بين سن 6 - 9 أشهر من العمر. ويكتمل ظهور كافة الأسنان المؤقتة عند معظم الأطفال في حوالي العام الثاني من العمر. يوجد 20 سنًّا مؤقتة في فم الطفل، 10 أسنان في كل فك. تتتألف هذه الأسنان في الفك الواحد من قواطع وأنيات، في كل فك أربع قواطع ونابان وأربع طواحن. تستخدم القواطع والأنيات لقطع الطعام، بينما تعمل الطواحن على طحنه. يظهر الرسم التوضيحي أنواع الأسنان وأماكن هذه الأسنان في الفم. تساعد الأسنان المؤقتة في عملية بروز الأسنان الدائمة في مكانتها الطبيعية. وت تكون غالبية الأسنان الدائمة بالقرب من جذور الأسنان المؤقتة. وبعد بلوغ الطفل حوالي ثلاث سنوات من العمر، تبدأ جذور مختلف الأسنان المؤقتة في الذوبان ببطء. وعندما يحين الوقت لظهور السن الدائم، يكون جذر السن المؤقت قد ذاب كاملاً ويصبح عندها تاج السن رخواً ويسقط.

الأسنان الدائمة

تبدأ تطورها بشكل مشابه للأسنان المؤقتة قبل مولد الطفل، تبدأ الأسنان الدائمة بالبروز بعد أن تبدأ الأسنان المؤقتة بالسقوط. تبدأ الأسنان الدائمة الأولى بالظهور عند بلوغ الطفل سن ست سنوات أو سبع. ومع ذلك يكون، لدى الطفل بين سن ست سنوات واثنتي عشرة سنة بعض الأسنان المؤقتة والدائمة. تظهر آخر الأسنان الدائمة في الفم عند بلوغ الشخص السن الذي يتراوح بين 17 - 21 عاماً. ت تكون الأسنان الدائمة في الشخص البالغ من 32 سنًّا دائمة منها 16 في كل فك. وهذه الأسنان أكبر وأضخم من الأسنان المؤقتة، وتضم أربعة أنواع من الأسنان هي القواطع والأنيات والضواحك والطواحن. ويحتوي كل فك على 4 قواطع ونابين و 4



ضواحك و 6 طواحن. ويصف السرد التالي الأنواع الأربع من الأسنان الدائمة. يُظهر الرسم التوضيحي أنواع الأسنان في الفم. القواطع الأسنان الرئيسية التي تُستخدم في القضم. وهي تحتوي على حافة قاطعة حادة مستقيمة. للقواطع في غالب الحالات جذر واحد. وتعتبر القواطع السفلية للفك أصغر الأسنان الدائمة. الأناب يُستخدم مع القواطع لقطع الطعام وطحنها. ولهذه الأسنان حافة حادة بارزة وجذر واحد. يطلق على الأناب أيضًا أسنان الكلب. وتعرف الأناب العلوية أحياناً بأسنان العين. الضواحك تُستخدم لسحق الطعام وطحنها لأنها تحتوي على سطح عريض بدلاً من الحافة الحادة المستخدمة للقضم. ويطلق على الكتل الصغيرة الموجودة على سطح السن حدبات. وتمكن الحدبات الأسنان من قطع الطعام وطحنها. يطلق على الضواحك أحياناً لقب مزدوجة الحدبات لأنها في غالب الحالات تحتوي على حدبتين. وتحتوي الضواحك العلوية الأولى عادة على جذرين بينما تحتوي الضواحك الأخرى على جذر واحد. تبرز الضواحك في مكان الطواحن المؤقتة. الطواحن تُستخدم كضواحك لطحن الطعام ويشبه شكلها الضواحك، إلا أنها أكبر حجماً. وتحتوي الطواحن المختلفة على عدد من الحدبات يتراوح بين 5-3 حدبات وجذرين أو ثلاثة جذور. لا تتشكل الطواحن الدائمة أسلف أي أسنان مؤقتة. وتنمو هذه الأسنان مع نمو الفكين بحيث يتوافق مكان لها. قد تكون واحدة أو أكثر من الطواحن الثلاثة مفقودة عند بعض الراشدين، وتعرف هذه الأسنان عادة بأضراس العقل. وفي غالب الحالات، لا ينمو الفك إلى درجة كافية بحيث يجد ضرس العقل مكاناً له، فيصبح ضرس العقل محشوراً بين عظم الفك وسن آخر. ويجب في هذه الحالة إزالة ضرس العقل.